

Bisolvon®



8 mg comprimido Cloridrato de bromexina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- ▶ Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- ▶ Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- ▶ Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- ▶ Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto

1. O que é Bisolvon e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar BISOLVON
3. Como tomar BISOLVON
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar BISOLVON
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é BISOLVON e para que é utilizado

BISOLVON comprimidos está indicado como adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das infeções respiratórias em presença de hipersecreção brônquica.

BISOLVON reduz a viscosidade das secreções brônquicas. O muco torna-se mais fluido. BISOLVON tem um efeito estimulador sobre a mucosa brônquica para produzir secreções brônquicas mais fluidas. Além disso, fica facilitada a drenagem do material tensoativo dos alvéolos pulmonares e dos brônquios. Juntamente com a ativação do epitélio ciliar da mucosa brônquica, estes mecanismos mantêm e melhoram a capacidade de autopurificação das vias aéreas. Facilita e acelera a eliminação do muco dos alvéolos pulmonares com a sua ação fluidificante e expetorante.

Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar BISOLVON

Não tome BISOLVON:

- ▶ se tem alergia à bromexina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6);
- ▶ se sofre de úlcera gastroduodenal;

- ▶ se sofre de doenças hereditárias raras em que haja incompatibilidade com um dos excipientes do medicamento (ver "BISOLVON contém lactose mono-hidratada").

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar BISOLVON

- ▶ Se tem tendência para sofrer de problemas gástricos, se sofre de doença hepática ou de insuficiência renal ou se tem asma, não tome Bisolvon sem consultar previamente o seu médico.

Tem havido notificações de reações da pele graves associadas à administração de cloridrato de bromexina. Se desenvolver uma erupção na pele (incluindo lesões nas membranas mucosas, tais como da boca, garganta, nariz, olhos, órgãos genitais), pare de utilizar Bisolvon e contacte o seu médico imediatamente.

Outros medicamentos e BISOLVON

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Não associe BISOLVON comprimidos com medicamentos antitússicos nem com secantes de secreções, pois possuem um efeito contrário ao pretendido.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Se está grávida deve evitar tomar BISOLVON, pois existem poucos dados disponíveis sobre o uso de bromexina durante a gravidez.

Desconhece-se se a bromexina é excretada no leite materno, consequentemente BISOLVON não deve ser tomado durante a amamentação.

Não existem dados que sugiram qualquer efeito do BISOLVON na fertilidade. Contudo, não foi estudado o efeito de BISOLVON na fertilidade humana.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foi estudado o efeito de BISOLVON na capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

BISOLVON contém lactose mono-hidratada.

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

3. Como tomar BISOLVON

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Administração via oral.

A dose recomendada é

8 mg (1 comprimido), 3 vezes ao dia.

No início do tratamento, poderá ser necessário aumentar a dose diária total, até um máximo de 48 mg, nos adultos.

Utilização em crianças e adolescentes

Não utilizar os comprimidos em crianças com idade inferior a 12 anos ou com peso inferior a 30 kg,



atendendo a que Bisolvon em xarope está disponível e é a forma farmacêutica recomendada para uso nas crianças.

- ▶ Crianças com idade superior a 12 anos: dose idêntica à dos adultos.

BISOLVON provoca uma diminuição da viscosidade do muco e o aumento da remoção do mesmo, sendo esperado um aumento da expectoração e da tosse, durante o tratamento com BISOLVON.

Se tomar mais BISOLVON do que deveria

Não são conhecidos casos de sobredosagem com BISOLVON. No entanto, caso acidentalmente tome mais BISOLVON do que o recomendado e venha a sofrer de alguns dos efeitos adversos de BISOLVON, consulte imediatamente o seu médico. Pode ser necessário fazer tratamento para aliviar os sintomas da sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de tomar BISOLVON

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

BISOLVON é geralmente bem tolerado. No entanto, embora pouco frequentes, podem ocorrer: náuseas, vômitos, diarreia e dor na parte superior do abdómen.

Mais raramente pode ainda ocorrer: broncospasmo

Raros (podem afetar até 1 em cada 1.000 pessoas):

Reações de hipersensibilidade
Erupção na pele, urticária

Desconhecido (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis):

Reações anafiláticas incluindo choque anafilático, angioedema (inchaço de aparecimento rápido na pele, nos tecidos subcutâneos, na mucosa ou submucosa) e prurido.

Reações adversas cutâneas graves (incluindo eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson/necrólise epidérmica tóxica e pustulose exantematosa generalizada aguda).

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Sítio da internet:

<http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar BISOLVON

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

Conservar na embalagem de origem.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior ou no recipiente, após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de BISOLVON

- ▶ A substância ativa é o cloridrato de bromexina. Cada comprimido contém 8mg de cloridrato de bromexina.
- ▶ Os outros componentes são lactose mono-hidratada, amido de milho, estearato de magnésio e água purificada.

Qual o aspeto de BISOLVON e conteúdo da embalagem

Comprimidos brancos, redondos com lados biselados e impressão "51B" numa face.

BISOLVON comprimidos é apresentado em embalagens de blisters PVC/PVDC/Alu contendo 20 comprimidos.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Opella Healthcare Portugal Unipessoal, Lda
Empreendimento Lagoas Park
Edifício 7 - 3º Piso, 2740-244 Porto Salvo - Portugal

Fabricante

Delpharm Reims S.A.S.
10, Rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims - França

Este folheto foi revisto pela última vez em junho de 2021